

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri


E.M. Ağayev
"10" may 2018-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

İNFLUSİD tabletlər
INFLUCID®

Tərkibi

Təsiredicimaddə: 1 tabletin (250mq) tərkibində 25 mq Aconitum (dərman akoniti) trit. D3, 25 mq Bryonia (ikievli küstüşam) trit. D2, 25 mq Eupatorium perfoliatum (Asırqalotu) trit. D1, 25 mq Gelsemium (həmişəyaşıl gelsemium) trit. D3, 25 mq Ipecacuanha (ipekakuana) trit. D3, 25 mq Phosphorus (fosfor) trit. D5 vardır.

Köməlçi maddələr: laktoza monohidrat, maqnezium-stearat, buğda nişastasası.

Farmakoterapevtik qrupu

Homeopatik dərman vasitəsi.

ATC kodu: R05X.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Homeopatik terapiya, xəstəlik anlayışında və dərman substansiyalarının istifadəsinə münasibətdə ənənəvi tibbi terapiyadan seçilir. Homeopatik vasitələr orqanizmin müdafiə gücünü stimullaşdırır və beləliklə özünümüalicə potensialını aktivləşdirir. Homeopatik vasitələrə qarşı orqanizmin cavabı qəti şəkildə fərdidir. Bu səbəbə görə dozaspesifik farmakoloji effektlər, farmakodinamik və ya farmakokinetik məlumatlar müəyyən edilə bilməz.

İstifadəsinə göstərişlər

Yuxarı tənəffüs yollarının qripəbənzər və digər kəskin virus infeksiyalarının müalicə və profilaktikası.

Əks göstərişlər

Preparatın istənilən komponentinə və ya Eupatorium perfoliatuma və ya digər mürək-kəbçiçəklilər fəsiləsinə aid bitkilərə qarşı yüksək həssəslıq.

Xüsusi xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri

Preparatın tərkibində laktoza və buğda nişastasası vardır. Qalaktozaya qarşı dözümsüzlüyü, laktaza çatışmazlığı və ya qlükoza-qalaktoza malabsorbsiyası kimi nadir irsi xəstəlikləri olan pasiyentlərə preparatdan istifadə etmək olmaz. Buğda nişastasasının tərkibində qlüten ola bilər (ancaq izi görünə biləcək qədər), bu səbəbə görə seliakialı pasiyentlərdə təhlükəli deyil. Buğdaya qarşı allergiyası olan pasiyentlər (seliakiyadan fərqlənir) preparatdan istifadə etməməlidirlər.

Aşağıdakı hallarda həkimə müraciət etmək lazımdır:

- xəstəliyin simptomları azalmadıqda və ya pisləşdikdə;
- əlavə şikayətlər meydana çıxdıqda;
- bədən temperaturu saxlandıqda və ya 39°C-dən yüksək olduqda.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri məlum deyil.

Homeopatik dərman vasitələri ilə müalicə digər dərman vasitələrinin qəbulunu istisna etmir.

Eyni vaxtda digər dərman vasitələrinin qəbuluna ehtiyac olduqda, həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Bütün digər preparatlar kimi, İnflusidi də hamiləlik və laktasiya dövründə, yalnız müvafiq həkim məsləhəti olduqda istifadə etmək olar.

Pediatriyada istifadəsi

Preparatı 1 yaşdan aşağı uşaqlara təyin etmək olmaz, belə ki, bu yaş qrupunda preparatın istifadəsi kifayət qədər öyrənilməmişdir.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Preparat nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə mənfi təsir etmir.

İstifadə qaydası və dozası

Dozalanma rejimi

Böyüklər

Kəskin vəziyyətdə, simptomların yaxşılaşmasına qədər hər 1 saatdan bir 1 tablet qəbul edilir. Preparatı gün ərzində 12 tabletdən çox istifadə etmək olmaz. Sonrakı müalicədə gündə 3 dəfə 1-2 tablet təyin edilir.

İnfeksiyaların profilaktikası məqsədilə gündə 3 dəfə 1-2 tablet istifadə edilir.

Pediatrik qrup

1-11 yaşlı uşaqlar

Kəskin hallarda, simptomların yaxşılaşmasına qədər hər 2 saatdan bir 1 tablet təyin edilir.

Gün ərzində 8 tabletdən artıq qəbul etmək olmaz. Sonrakı müalicədə gündə 3 dəfə 1 tablet təyin edilir.

12 yaşdan yuxarı uşaqlar

Kəskin hallarda, simptomların yaxşılaşmasına qədər hər 1 saatdan bir 1 tablet qəbul edilir.

Gün ərzində 12 tabletdən artıq istifadə etmək olmaz. Sonrakı müalicədə gündə 3 dəfə 1-2 tablet təyin edilir.

İnfeksiyanın profilaktikası məqsədilə 12 yaşa qədər uşaqlar gündə 3 dəfə 1 tablet, 12 yaşdan yuxarı uşaqlar gündə 3 dəfə 1-2 tablet qəbul etməlidirlər.

İstifadə qaydası

Preparatı yeməkdən ya 30 dəqiqə əvvəl, ya da 30 dəqiqə sonra qəbul etmək lazımdır.

Tabletlər tədricən ağız boşluğunda əriyir. Azyaşlı uşaqlara tabletləri xırdalayıb və bir qədər suda həll edərək vermək olar.

Əlavə təsirləri

Çox nadir hallarda (< 1/10000) və ya məlum olmayan (əldə olan məlumatlara görə tezliyi qiymətləndirmək mümkün deyil):

Hiperhəssaslıq reaksiyaları, məsələn, dəridə səpgi və mədə-bağırsaq pozulmaları. Belə hallarda preparatın qəbulunu dayandırmaq və həkimə müraciət etmək lazımdır.

Qeyd

Homeopatik dərman vasitələrinin istifadəsi zamanı müvəqqəti olaraq ilkin pisləşmə mümkündür. Bu zaman İnflusidin istifadəsini dayandırmaq və həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.

Doza həddinin aşılması

Müəyyən edilməmişdir.

Buraxılış forması

Tabletlər. 60 tablet qutuda (3 blister 20 tabletdən) içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

15°C - 25°C temperaturda orijinal qablaşdırmada, uşaqlardan qorunan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

5 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resepsiz buraxılır.

İstehsalçı

Doyçe Homeopati-Yunion DHU- Arzneymittel QmbH&Ko.KQ

Almaniya, 76227 Karlsruhe, Ottostrasse 24.

Tel.: +49(721) 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG

Germany, Karlsruhe 76227, Ottostrasse 24

Tel. +49 (721) 40 93 236

Doktor Vilmar Şvabe QmbH&Ko.KQ, Almaniya.

Karlsruhe 76227, Vilmar Şvabe Ştrasse 4.

Tel.: 49 (0) 721 40 050; +49 (0) 721 40005 165

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG

Germany, 76227 Karlsruhe, Willmar-Schwabe-Str. 4

Tel. +49 (0) 721 4005 0, + 49 (0) 721 40005 165