



“ ” 2015-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

Bu dərman vasitəsini qəbul etməzdən əvvəl bu içlik vərəqəsini diqqətlə oxuyun!
İçlik vərəqəsini saxlayın. Onu bir daha oxumağa ehtiyac yarana bilər. Daha ətraflı məlumatı həkiminiz və ya əczaçıdan alın. Zəruri hesab etsəniz məsləhət üçün onlara müraciət edin.

QASTRİTOL daxilə qəbul üçün damcı
GASTRITOL

Tərkib:

Təsireddi maddələr: 100 ml dərman vasitəsinin təkibində qaz qaytarması (Anserinae herba) otunun maye ekstraktı (1:1,7-2,2) (ekstragent: etanol 40% (həcm faizi/həcm faizi) 35 ml, aptek çobanyastığı çıçaklılarının duru ekstraktı (Matricariae flos) (1:1,7-2,2) (ekstragent: etanol 45% (həcm faizi/həcm faizi)) 20 ml, biyan kökünen duru ekstraktı (Liquiritiae radix) (1:1,7 – 2,2) (ekstragent: etanol 40% (həcm faizi/həcm faizi) 15 ml, mələkotu kökünen duru ekstraktı (Angelicae radix) (1:1,7 – 2,2) (ekstragent: etanol 40% (həcm faizi/həcm faizi) 5 ml, kardobenedikt otunun duru ekstraktı (cnici ben. herba) (1:1,7 – 2,2) (ekstragent: etanol 40% (həcm faizi/həcm faizi) 5 ml, yovşan otunun duru ekstraktı (Absinthii herba) (1:1,7 – 2,2) (ekstragent etanol 40% (həcm faizi/həcm faizi) 5 ml.

Köməkçi maddələr: etanol 40% (həcm faizi/həcm faizi), təmizlənmiş su

Təsviri

Şəffaf qəhvəyi maye.

Farmakoterapeutik qrupu

Həzm traktının funksional pozulmaları zamanı istifadə edilən vasitələr.

ATC kodu: A03A X.

İstifadəsinə göstərişlər

Funksional dispəpsiya, meteorizm, qastrit, həmçinin xroniki hiperasid qastrit, eyni zamanda mədə və onikibarmaq bağırsaq xorasının kompleks müalicəsinin tərkibində.

Əks göstərişlər

Preparatın hər hansı inqrediyentinə qarşı hiperhəssaslıq, preparatın komponentlərinə qarşı allergik reaksiyalar.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıq təsiri

Bu vaxta qədər müəyyən edilməyib.

Ehtiyat tədbirləri

Qastitol preparatının tərkibində 40 həcm%-i etanol vardır.

Preparatın 1 damcısının tərkibində 0,016 q etanol vardır.

Təlimata əsasən preparatın qəbulu zamanı hər doza ilə (25 damcı) 0,4 q spirt qəbul edilir. Bu isə qaraciyər xəstəliyi, mərkəzi sinir sistemi zədələnmələri olan xəstələr, alkoqolizm, epilepsiya xəstələri, hamilə qadınlar və uşaqlar üçün təhlükə yarada bilər. Digər dərman vasitələrinin təsiri azala və ya çoxala bilər.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Belə hallarda preparatın qəbuluna dair kifayət qədər təcrübə olmadığına görə hamiləlik və laktasiya dövründə qəbul edilməsi məsləhət görülmür.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Preparatın terapevtik doza çərçivəsində qəbul olunması nəqliyyat vasitəsinin idarə olunmasına və ya digər mexanizmlərlə işləməyə təsir göstərmir.

Uşaqlarda istifadəsi

Uşaqlara tətbiq olunmasına dair kifayət qədər təcrübə olmadığına görə 12 yaşdan aşağı uşaqlarda istifadə olunması məsləhət görülmür.

İstifadə qaydası və dozası

Digər göstərişlər olmadığı halda gündə 3 dəfə yemək zamanı az miqdarda maye ilə qarışdırılmış halda 20-30 damcı qəbul etmək lazımdır. Ağır və kəskin vəziyyətdə hər 30 dəqiqədən - 1 saatdan bir 15-25 damcı qəbul etmək lazımdır. Belə müalicə sxemi təkrar müalicə zamanı da istifadə olunur.

Müalicə müddəti – 3- 4 həftə. Zərurət olarsa, müalicə kursunu 2 aydan sonra təkrar etmək olar.

Əlavə təsirləri

Çox nadir hallarda işığa qarşı dərinin çox yüksək həssaslığı olan xəstələrdə, intensiv günəş şüalarının təsiri altında inkişaf edən günəş yanıkları formasında dəri reaksiyaları yaranı bilər.

Preparatın ayrı-ayrı komponentlərinə qarşı fərdi dözümsüzlüyün olması üzrə ədəbiyyat mənbələrində allergik reaksiyalar (dərinin qızarması, səpgi, qaşınma), mədə-bağırsaq trakti tərəfindən yaranan reaksiya (ürəkbulanma, quşma), su-elektrolit balansının pozulması kimi hallar qeyd edilmişdir.

Lakin, Qastitol preparatının qəbulu zamanı belə əlavə təsirlərin baş verməsi haqqında məlumatlar daxil olmamışdır.

Buraxılış forması

Damcısalan ilə 20ml, 50 ml, 100 ml məhlul, flakonlarda. 1 flakon damcıladıcı və içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən yuxarı olmayan temperaturda, orijinal qablaşdırımda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

3 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Flakon açıldıqdan sonra istifadə müddəti – 3 aydır.

Aptekdən buraxılma şərti

Reseptsiz buraxılır.

İstehsalçı

Dr. Qustav Klain GmbH & Ko.KQ

Ştaynenfeld 3, 77736 Sell am Xarmersbach, Almaniya

Dr. Gustav Klein GmbH & Co.KG

Steinfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany