



TƏSDİQ EDİLMİŞDIR

Azərbaycan Respublikası

Səhiyyə Nazirliyi

Farmakoloji və Farmakopeya

Ekspert Şurasının sənəti

E. M. Agayev

2015-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

Bu dərman vasitəsini qəbul etməyə başlamazdan əvvəl bu içlik-vərəqəni diqqətlə oxuyun!
İçlik-vərəqəni saxlayın, ola bilsin ki, Sizə onu yenidən oxumaq lazımlı gələ bilər.
Daha ətraflı məlumatı Siz həkiminizdən və ya əczaçıdan ala bilərsiniz. Əgər lazımlı bilsəniz,
məsləhət üçün onlara müraciət edin.

SOLIDAQOREN oral damcı
SOLIDAGOREN®

Tərkibi

Təsireddici maddə: 10 ml (= 9,5 q) damcının tərkibində 7,9 ml qızılısbət otu (Solidaginis herba),
qazayağı otu (Anserinae herba qarışığının (1:1,5 - 2,1), qatırquyruğu otunun
(Equiseti Herba) duru ekstraktı (4,2 : 1,4 : 1) vardır, ekstragent: etanol
50 % (həcm/həcm);

Köməkçi maddələr: təmizlənmiş su, etanol 96%.

Təsviri

Qəhvəyi rəngli şəffaf maye.

Farmakoterapeutik qrupu

Urologiyada istifadə olunan vasitələr.

ATC kodu: G04BP50

İstifadəsinə göstərişlər

Sidik kisəsinin (sistit) və böyrəklərin (pielonefrit) kəskin və xronik infeksiyalarda əsas (bazis) müalicə, həmcinin kompleks müalicənin komponenti kimi.

Böyrəklərin xronik qeyri-infeksion xəstəlikləri (glomerulonefrit, interstisiyal nefrit).

Sidik daşlarının əmələ gəlməsinin profilaktikası, o cümlədən onların xaric edilməsindən sonra.

Əks göstərişlər

Preparatin təsireddici maddəsinə və ya digər komponentlərindən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq. Solidaqoren preparati Astrakimilər (Asteraceae) fəsiləsindən olan bitkilərə allergiyası olan şəxslər tərəfindən istifadə edilməməlidir, belə ki, bu fəsilədən olan bitkilər bu preparatin tərkibinə daxil olan bitki ekstraktlarının istehsalında istifadə olunur.

Digər dərman vasitəleri ilə qarşılıqlı təsiri

Digər dərman vasitəleri ilə qarşılıqlı təsiri məlum deyil.

Preparatin tərkibində spirt olduğu üçün o, digər preparatların təsirini dəyişə bilər.

Ehtiyat tədbirləri

Preparati ürək çatışmazlığı və ya böyrək çatışmazlığı nəticəsində yaranan ödemlərin diuretik müalicəsi üçün istifadə etmək tövsiyə edilmir. Bunu, xüsusilə ahil yaşlı insanlarda istifadə zamanı nəzərə almaq lazımdır.

Sidikdə qan olduqda, bədən temperaturu yüksək olduqda və ya simptomatikanın 5 gündən artıq saxlandığı zaman həkimə müraciət etmək tövsiyə olunur.

Preparatın tərkibində 45% həcm/həcm spirt vardır. Tövsiyə olunan dozaya əməl etdikdə orqanizmə hər 30 damcının qəbulu ilə 0,6 q spirt daxil olur.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Solidaqoren hamiləlik və laktasiya dövründə yalnız ana üçün fayda/döl (uşaq) üçün risk nisbətinin həkim tərəfindən hərtərəfli qiymətləndirilməsindən sonra istifadə oluna bilər.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Tövsiyə edilən dozalara əməl etdikdə təsir göstərmir.

Uşaqlar

Preparat 12 yaşa qədər uşaqlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmamışdır.

Istifadə qaydası və dozası

Böyüklərə və 12 yaşdan böyük uşaqlara:

Gündə 3 dəfə 20 - 30 damcı Solidaqoren. 30 damcı 1,4 ml-ə müvafiq gəlir.

Solidaqoreni kifayət qədər maye ilə içmək lazımdır.

Istifadə müddəti həkim tərəfindən fərdi olaraq müəyyən edilir.

Əlavə təsirləri

Çox nadir: yüksək həssaslıq reaksiyaları və allergik reaksiyalar.

Tezliyi məlum olmayan: mədə-bağırsaq traktında yüngül pozğunluqlar.

Allergik reaksiyanın ilk əlamətləri (məsələn, səpgi) meydana çıxan kimi, preparatın qəbulunu dayandırmaq lazımdır. Bu təlimatda qeyd edilməyən əlavə təsirlər meydana çıxarsa, həkimə müraciət etmək lazımdır.

Buraxılış forması.

Oral damcı. 20 ml, 50 ml və ya 100 ml damcı, damcıladicısı və burulub açılan plastmas qapağı olan flakonda. 1 flakon içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, orijinal qablaşdırmasında saxlamaq lazımdır..

İşıqdan qorunan və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

3 il.

Flakon açıldıqdan sonra saxlanma müddəti – 3 ay.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra Solidaqoreni istifadə etməyin.

Aptekdən buraxılma şərti

Reseptsiz buraxılır.

İstehsalçı

Dr. Gustav Klyayn QmbH & Co. KG

Ştaynenfeld 3, 77736 Sell am Harmersbach, Almaniya /

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany