



“22 April 2015-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

PROSPAN® daxilə qəbul üçün damcı
PROSPAN®

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 ml preparatın tərkibində 0,02 q plüs yarpaqlarının quru ekstraktı (5 – 7, 5:1) vardır.

Köməkçi maddələr: təmizlənmiş su, natrium saxarin, etanol 96%, cirə yağı, razyana yağı, nanə.

Təsviri

Tünd-qəhvəyi rəngli, spirt və razyana ətirli maye. Saxlanıldığı müddətdə tutqunlaşa və çöküntü verə bilər.

Farmakoterapevtik qrupu

Bitki mənşəli bəlgəmgətirici vasitə.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Öskürəkəleyhinə bitki mənşəli preparat.

Bəlgəmgətirici, mukolitik və spazmolitik təsir göstərir. Bəlgəmin qatılığını azaldır və onun xaric olmasını asanlaşdırır.

İstifadəsinə göstərişlər

Öskürək və yuxarı tənəffüs yollarının və ağciyərlərin çətin ayrılan bəlgəmlə müşayiət olunan iltihabi xəstəliklərinin müalicəsində bəlgəmgətirici vasitə kimi.

Əks göstərişlər

Preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq, uşaqlıq dövrü (1 yaşa qarşı); alkoqol qəbulunun zərərli olduğu alkoqolizm və digər hallar.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləlik və laktasiya dövründə preparatın istifadə edilməsi üzrə tədqiqat aparılmadığına görə yalnız həkimlə ilkin məsləhətləşmədən sonra istifadə etmək olar.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Preparati öskürəyə qarşı dərman vasitələri (belə dərman vasitələri durulaşdırılmış bəlgəmin öskürərəklə tüpürülməsini çətinləşdirir) ilə eyni zamanda qəbul etmək olmaz.

Xüsusi göstərişlər

Preparatın tərkibində 47 həcm%-i alkoqol vardır. Tərkibində şəkər, konservantlar və boyanın maddələri yoxdur. Preparatın saxlanıldığı müddətdə çöküntünün yaranması, dadının az miqdarda dəyişməsi baş verə bilər ki, bu da preparatin terapevtik effektinə təsir göstərməyəcək.

İstifadə qaydası və dozası

Daxilə.

1-3 yaşlı uşaqlar: gündə 3-5 dəfə 10 damcı;

4-7 yaşlı uşaqlar: gündə 3-5 dəfə 15 damcı;

Məktəb yaşlı uşaqlar və böyükər: gündə 3-5 dəfə 20 damcı;

Damcılar yemək zamanı qəbul edilməlidir. Azyaşlı uşaqlara az miqdarda su ilə vermək məsləhət görülür.

Müalicə kursu xəstəliyin ağırlığına əsasən müəyyən edilir. Minimum kurs müalicəsi 1 həftə olmalıdır.

Terapevtik təsirin saxlanılması üçün xəstəlik simptomları aradan qalxdıqdan sonra müalicəni daha 2-3 gün ərzində davam etdirmək lazımdır.

Vəziyyət yaxşılaşmadıqda həkimə müraciət etmək zəruridir.

Prospan damcısı® preparatının istifadəsiilə aparılan inhalyasion terapiya

Prospan® damcılardan istifadə etməklə inhalyasiyanın aparılması üçün qızdırımdan toz halına salmaq üçün istifadə olunan bütün standart qurğular və alətlər münasibdir. Tərkibindəki alkoqola görə qıcıqlanmanın əlavə təsirlərinin qarşısını almaq məqsədilə Prospan® preparatını inhalyasiya üçün 1:2 nisbətində içməli su ilə qarışdırmaq olar. Xüsusi inhalyasiya qurğusuna preparatdan 20-25 damçı əlavə etmək və 1:2 nisbətində otaq temperaturunda olan içməli su ilə qarışdırmaq.

İnhalyasiyanı gündə 3-5 dəfə etmək.

Əlavə təsirləri

Allergik reaksiyalar mümkündür.

Doza həddinin aşılması

Göstərilmiş gündəlik dozanı əhəmiyyətli dərəcədə aşan (3 dəfədən çox) dozada qəbul etmək ürəkbulanma, qusma və diareya törədə bilər.

Buraxılış forması

Daxilə qəbul üçün damçı. 20 ml, mantar-damcısalanlı və burulub açılan qapaqlı tünd şüşə flakonlarda. 1 flakon içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır!

Yararlılıq müddəti

4 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Reseptsiz buraxılır.

İstehsalçı

Engelhard Arzneimittel GmbH və Ko. KG, Almaniya /