



TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri

E.M. Ağayev

"22" April 2015-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

PROSPAN şerbət
PROSPAN®

Tərkibi

Təsireddi maddə: 1 ml şerbətin tərkibində 7 mq sarmaşık yarpaqlarının quru ekstraktı (ekstragent – etanol 30% (5-7,5:1)) vardır.

Köməkçi maddələr: təmizlənmiş su, kalium sorbat, susuz limon turşusu, kristallaşan sorbitol mayesi, ksantan kitrəsi, albalı aromatizatoru

Təsviri

Açıq-qəhvəyi rəngdə, bir az bulanıq, albalı ətirli şerbət.

Farmakoterapevtik qrupu

Bitki tərkibli bəlgəmgətirici vasitə.

ATC kodu: R05CA

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Öskürəyə qarşı bitki tərkibli preparat. Bəlgəmgətirici, mukolitik və bronxospazmolitik təsir göstərir. Bəlgəmin qatılığını azaldır və onun xaric olmasını asanlaşdırır.

Farmakokinetikası

Preparat sarmaşık yarpaqlarının quru ekstraktından ibarət olduğuna və tərkibində bioloji aktiv maddələr kompleksi olduğuna görə farmakokinetik tədqiqatların aparılması mümkününsüzdür.

İstifadəsinə göstərişlər

Nəfəs yollarının çətinayırılan bəlgəmli öskürəklə müşayiət olunan kəskin və xroniki iltihabi xəstəliklərinin müalicəsində bəlgəmgətirici vasitə kimi.

Əks göstərişlər

Preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq, saxaraza/izomaltaza çatışmazlığı, fruktozaya qarşı həssaslıq, qlükoza-qalaktoza malabsorbsiya sindromu.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Preparati öskürəkəleyhinə digər dərman vasitələri ilə birlikdə istifadə etmək olmaz, çünki bu, bəlgəmin xaric olmasını çətinləşdirir.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləlik və laktasiya dövründə preparatın istifadəsinin təhlükəsizliyinə dair məlumat az olduğuna görə, xəstələrin bu qrupuna preparatı qəbul etmək məsləhət görülmür.

Xüsusi göstərişlər

Preparatın tərkibində alkoqol, şəkər və boyanın maddələri yoxdur. Saxlama müddəti ərzində şerbətin rənginin bir az bulanıq olması və dadının cüzi dəyişməsi mümkündür, lakin bu, preparatın terapevtik təsirini dəyişmir.

Şəkərli diabet xəstələri nəzərə alınmalıdır ki, 2,5 ml şerbətin tərkibində 0,08 ÇV-yə müvafiq olan 0,963 q sorbitol vardır.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Preparat nəqliyyat vasitəsini idarə etmək və yüksək diqqət və sürətli psixomotor reaksiya tələb edən digər potensial təhlükəli fəaliyyət növləri ilə məşğul olma qabiliyyətinə təsir etmir.

İstifadə qaydası və dozasi

Daxilə. Südəmər uşaqlara (0-1 yaş) gündə 2 dəfə 2,5 ml. Körpə uşaqlara (1-6 yaş) gündə 3 dəfə 2,5 ml. Məktəbli uşaqlara və yeniyetmələrə gündə 3 dəfə 5 ml. Büyüklərə gündə 3 dəfə 5-7,5 ml. Preparatın dozalara bölünməsi ölçü stəkanı vasitəsi ilə aparılır.

Müalicə kursu xəstəliyin ağırlığı ilə ölçülür, minimal müalicə kursu 1 həftə təşkil edir.

Terapevtik effektin möhkəmləndirilməsi üçün simptomlar yox olduqdan sonra 2-3 gün ərzində müalicəni davam etdirmək məsləhət görülür. Vəziyyət yaxşılaşmadığı zaman həkimə müraciət etmək lazımdır. İstifadə etməzdən əvvəl qarışdırın!

Əlavə təsirləri

Allergik reaksiya mümkünündür.

Çox nadir hallarda preparatdan istifadə zamanı işlədici təsir (tərkibində sorbitol olduğuna görə) müşahidə edilə bilər.

Doza həddinin aşılması

Təyin edilmiş dozadan artıq olan dozanın (gündə 3 dəfədən artıq) qəbul edilməsi ürəkbulanma, qusma və diareyaya səbəb ola bilər. Bu halda xəstə həkimə müraciət etməlidir.

Müalicə: preparatdan imtina, simptomatik terapiya.

Buraxılış forması

100 ml və ya 200 ml şerbət, dozalayıcı-tıxacı, polietilen burulan qapağı olan tünd şüşə flakonlarda. 1 flakon ölçü stəkanı və içlik vərəqə ilə birləşdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlama şəraiti

25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır!

Yararlılıq müddəti

3 il.

Flakon açıldıqdan sonra yararlılıq müddəti – 3 ay.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Reseptsiz buraxılır.

İstehsalçı

Engelhard Arzneimittel GmbH və Ko. KG, Almaniya /