

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri

E. M. Ağayev

“ 05 ” iyun 2015-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

*Dərman vasitəsinə istifadə etməzdən əvvəl bu içlik vərəqəni diqqətlə oxuyun.
İçlik vərəqəni saxlayın, ola bilsin ki, Sizə onu yenidən oxumaq lazım olacaq.
Əlavə məlumat və ya məsləhəti Siz həkiminizdən və ya əczaçınızdan ala bilərsiniz.*

TIROZUR yerli istifadə üçün gel
TIROZUR

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 q gelin tərkibində 1 mq tirotrisin vardır.
Köməkçi maddələr: setilpiridin xlorid, propilenqlikol, etanol 96 %, karbomer,
trometamol, təmizlənmiş su

Farmakoterapevtik qrupu

Yerli istifadə üçün antibiotiklər.

İstifadəsinə göstərişlər

Cüzi miqdarda ekssudatın ifrazatı və tirotrisinə qarşı həssas patogen mikro-orqanizmlərin səbəb olduğu superinfeksiya ilə müşahidə olunan səthi yaralar

Əks göstərişlər

Preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Bu vaxta qədər məlum deyil.

Əgər siz hal-hazırda digər dərman vasitələrindən istifadə edirsinizsə və ya yaxın zamanlara qədər istifadə etmişsinizsə, mütləq bu barədə müalicə həkiminə məlumat verin.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Gözətrafi nahiyədə istifadə edən zaman diqqətli olmaq lazımdır, çünki bu yanma hissi yarada bilər. Tirozur gelinin tərkibində dərinin qıcıqlanmasına səbəb ola biləcək polietilen qlikol vardır.

İntranazal istifadə üçün nəzərdə tutulmamışdır; bunun, iybilmə qabiliyyətinin pozulmasına gətirib çıxarması barədə məlumatlar vardır.

Tirozur gelini digər dərman preparatları kimi hamiləlik və laktasiya dövründə həkimlə məsləhətləşdikdən sonra və gözlənilən müsbət təsir və mümkün risk nisbətinin obyektiv şəkildə dəyərləndirilməsindən sonra tətbiq etmək lazımdır.

Zərurət yarandığı təqdirdə Tirozur gelini istənilən yaşda uşaqlarda istifadə etmək olar.

İstifadə qaydası və dozası

Geli dərinin zədələnmiş sahələrinə gündə 2-3 dəfə olmaqla nazik təbəqə şəklində çəkməli. Bədənin açıq hissələrinin dərisində kiçik yara və iltihabın olduğu zaman onları bağlamağa, adətən, ehtiyac olmur. Böyük zədələnmələr və ya sulanan yaraların olduğu zaman 1-2 gündən sonra dəyişmək şərti ilə qoruyucu sarğı tövsiyə olunur. Müalicənin davam etmə müddəti fərdi qaydada müəyyənləşdirilir. Müalicəyə başladıqdan bir həftə sonra yaxşılaşmanın olmadığı təqdirdə həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.

Əlavə təsirləri

Allergik reaksiyalar (yanma hissi) ola bilər.

Yararlılıq müddəti

3 il.

Tubun ilk açılmasından sonra yararlılıq müddəti - 3 ay.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Saxlanma şəraiti

25⁰C - dən yüksək olmayan temperaturda, uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Buraxılış forması

1 tub içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Aptekdən buraxılma şərti

Resepsiz buraxılır.

İstehsalçı

Engelxard Artsnaymittel QmbH&Co.KQ

Xertsberqstrasse, 3, 61138 Niderdorfelden, Almaniya