

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri

E.M. Ağayev
“ ” 2015-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

Bu dərman vasitəni qəbul etməzdən əvvəl bu içlik vərəqəni diqqətlə oxuyun.
İçlik vərəqəni atmayın, ola bilsin ki, Siz onu yenidən oxumalı olarsınız. Əlavə məlumatı Siz həkiminizdən və ya əczaçınızdan əldə edə bilərsiniz.

TRAXİSAN® sorma tabletlər
TRACHISAN

Tərkibi

Təsireddi maddələr: 1 tabletin tərkibində 0,5 mq tirotrisin, 1 mq lidokain hidroxlorid, 1 mq heksidin biqlükonat vardır.

Köməkçi maddələr: sorbitol (E420), maqnezium-stearat, nanə yağı

Farmakoterapevtik qrupu

Boğaz xəstəlikləri zamanı istifadə edilən preparatlar

İstifadəsinə göstərişlər

Stomatit, qinqivitlər, parodontitlər, qlossitlər, tonzillitlər, faringitlər və udma prosesinin pozulması ilə müşayiət edilən digər vəziyyətlər kimi ağız boşluğu və udlığın (boğazın) iltihabı və yoluxucu xəstəlikləri. Ağız boşluğu və udlaqda həyata keçirilən cərrahi müdaxilədən (məsələn, dişin ekstraksiyası, tonsillektomiya) əvvəl infeksiyaların profilaktikası.

Əks göstərişlər

Fruktozaya qarşı həssaslığın olduğu zaman təyin etmək olmaz. Preparatin hər-hansı bir inqrediyentinə qarşı məlum hiperhəssaslığı zamanı təyin etmək olmaz.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Bu vaxta qədər digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri məlum deyil.

Xüsusi xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri

Preparati 4 yaşdan kiçik uşaqlara tətbiq etmək məsləhət görülmür, çünki preparati sormaq lazımdır. Bütün digər əczaçılıq preparatlarında olduğu kimi, Traxisan-ı hamiləlik və laktasiya dövründə yalnız həkimlə ilkin məsləhətləşmə apardıqdan sonra qəbul etmək olar.

İstifadə qaydası və dozası

Hər 2 saatdan bir 1 tablet ağız boşlığında sormaq lazımdır. Böyükəklər və 12 yaşdan böyük uşaqlar üçün – 8 tablet; 4 yaşdan 12 yaşa qədər uşaqlar üçün – 6 tablet. Bir qayda olaraq, xəstəliyin əlamətləri artıq bir neçə gündən sonra aradan qalxır, ancaq sabit terapevtik effektə

nail olmaq üçün daha 2-3 gün müalicəni davam etdirmək lazımdır. Preparatin istifadə edilməsindən 5 gün sonra xəstənin vəziyyətində yaxşılaşma qeyd olunmazsa, həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.

Əlavə təsirləri

TRAXISAN® -dan istifadə zamanı dadın dəyişməsi və dilin keyləşməsi mümkündür. Bu əlavə təsirlər preparatin qəbulunu dayandırıldıqdan sonra öz-özünə aradan qalxır. Uzun müddət istifadə etdikdə nadir hallarda dişlərin, diş plomblarının, protezlərin və ya dilin sarı və ya açıq qəhvəyi rəngə boyanması mümkündür ki, bunu da ağız boşluğunun gigiyenəsinə əməl etməklə aradan qaldırmaq olar. Ancaq bu effekt preparatin qəbulunu dayandırıldıqdan dərhal sonra aradan qalxır.

Buraxılış forması

10 tablet, blisterdə. 2 blister içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən yuxarı olmayan temperaturda quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

3 il.

Qablaşdırmanın üzərində göstərilən yararlılıq müddəti bitdikdən sonra preparatdan istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Reseptsiz buraxılır.

İstehsalçı

Engelhard Artsnaymittel

QmbH&Ko.KQ

Almaniya, 61138 Niderdorfelden

Xertsberqstrasse 3.