

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR,
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri

 E.M. Ağayev

“13 sentyabr” 2021-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

INFLUSID A tabletlər
INFLUCID® A

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: yoxdur.

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 tabletin (250 mq) tərkibində 25 mq dərman kəpənəkçiçəyi (Aconitum trit.) D3, 25 mq helsemium (Gelsemium trit.) D3, 25 mq qusdurucu kök (Ipecacuanha trit.) D3, 25 mq fosfor (Phosphorus trit.) D5, 25 mq küstüşəm (Bryonia trit.) D2, 25 mq dəlikyarpaq asırqalotu (Eupatorium perfoliatum trit.) D1.

Köməkçi maddələr: laktoza monohidrat, buğda nişastası, maqnezium stearat.

Təsviri

Yastı-silindrik formalı, iti qıraqlı, ağ və ya demək olar ki, ağ rəngli tabletlərdir, xalların mövcudluğu mümkündür.

Farmakoterapevtik qrupu

Homeopatik dərman vasitəsi.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Homeopatik müalicə xəstəliyin anlamına və dərman preparatlarının istifadəsinə görə ənənəvi təbabətdən nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqlənir. Homeopatik preparatlar orqanizmin qoruyucu mexanizmlərini stimullaşdırır və beləliklə, orqanizmin özünü bərpa etmək qabiliyyətini aktivləşdirirlər. Orqanizmin homeopatik dərman preparatlarına qarşı reaksiyası çox fərddir. Bu səbəblərdən, onların dozadan asılı spesifik farmakoloji effektlərini, farmakodinamik və farmakokinetik xüsusiyyətlərini müəyyən etmək mümkün deyil.

İstifadəsinə göstərişlər

Qızdırma ilə müşayiət olunan qripəbənzər infeksiyaların və yuxarı tənəffüs yollarının digər kəskin virus infeksiyalarının müalicəsi və profilaktikası. Qripin dəstəkləyici müalicəsi.

Əks göstərişlər

Dəlikyarpaq asırqalotu (adi asırqalotu) bitkisinə və ya astra/mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin digər nümayəndələrinə, preparatın tərkibinə daxil olan digər təsiredici maddələrə və ya preparatın hər hansı digər komponentinə qarşı yüksək həssaslıq.

1 yaşa qədər uşaqlara preparatın istifadəsi əks göstərişdir.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Həkim pasiyentdə istənilən şəkər növünə qarşı dözümsüzlüyün mövcudluğunu müəyyən etdiyi halda, preparatın istifadəsinə başlamazdan əvvəl həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.

Dərman preparatının tərkibinə laktoza və buğda nişastasası daxildir. Bu səbəbdən, qalaktozaya qarşı dözümsüzlük, Lapp laktaza çatışmazlığı və ya qlükoza-qalaktozaya malabsorbsiyası kimi nadir irsi xəstəliklər qeyd olunan pasiyentlərdə preparatı istifadə etmək olmaz. Buğda nişastasasının tərkibində yalnız çox az miqdarda qlüten ola bilər və bu səbəbdən, seliakiyadan əziyyət çəkən pasiyentlər üçün preparat təhlükəsiz hesab edilir. Buğdaya qarşı allergiya (seliakiyadan fərqli) qeyd olunan pasiyentlər preparatdan istifadə etməməlidirlər.

Aşağıda göstərilən simptomlar meydana çıxdığı halda, həkimlə məsləhətləşmək tələb olunur:

- pasiyentin vəziyyəti yaxşılaşmadıqda və ya daha da pisləşdiyi halda;
- əlavə şikayətlər meydana çıxdıqda;
- bədənə yüksək temperaturu saxlandıqda və ya 39°C-dən yüksək olduğu halda.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Digər dərman preparatları ilə qarşılıqlı təsirləri müşahidə olunmamışdır. Bu homeopatik dərman preparatının istifadəsi, digər dərman preparatlarının istifadəsini istisna etmir.

Pasiyentlərə hazırda və ya bir müddət əvvəl istifadə etdikləri və ya gələcəkdə istifadəsi nəzərdə tutulan digər dərman preparatları barədə həkimlə məsləhətləşmələri tövsiyə olunur.

Qeyd. Neqativ həyat vərdişləri, məsələn, tütünün və ya alkoqolun istifadəsi, homeopatik dərman preparatlarının effektlərinə mənfi təsir göstərə bilər.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləlik və laktasiya dövründə preparatı yalnız, fayda və risk nisbətinin qiymətləndirilməsini nəzərə alaraq, istifadə etmək olar.

Göstərilən dərman preparatının istifadəsinə başlamazdan əvvəl həkimlə məsləhətləşmək tövsiyə olunur.

Nəqliyyat vasitəsini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Təsir göstərmir.

İstifadə qaydası və dozası

Preparatdan istifadə etdikdə, hər zaman bu içlik vərəqədə qeyd olunan göstərişlərə və ya həkimin və ya əczaçının təyinatlarına riayət etmək vacibdir. Preparatın düzgün istifadəsinə dair hər hansı şübhə meydana çıxdığı halda, həkimlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşmək lazımdır.

Dozalanma rejimi

Böyüklər

Kəskin vəziyyətlərdə – pasiyentin vəziyyəti yaxşılaşmayana qədər, bir saatlıq fasilələrlə 1 tablet – gündə maksimum 12 tabletdə qədər istifadə etmək olar.

Davamlı müalicə məqsədi ilə – gündə 3 dəfə 1-2 tablet.

İnfeksiyaların profilaktikası məqsədi ilə, gündə 3 dəfə 1-2 tablet istifadə etmək lazımdır.

Uşaqlar

1 yaşdan 11 yaşa qədər uşaqlar

Kəskin vəziyyətlərdə – pasiyentin vəziyyəti yaxşılaşmayana qədər, hər 2 saatdan bir 1 tablet – gündə maksimum 8 tabletdə qədər istifadə etmək olar.

Davamlı müalicə məqsədi ilə – gündə 3 dəfə 1 tablet.

Yaşı 12 və daha yuxarı olan uşaqlar

Kəskin vəziyyətlərdə – pasiyentin vəziyyəti yaxşılaşmayana qədər, bir saatlıq fasilələrlə 1 tablet – gündə maksimum 12 tabletdə qədər istifadə etmək olar.

Davamlı müalicə məqsədi ilə – gündə 3 dəfə 1-2 tablet.

İnfeksiyaların profilaktikası məqsədi ilə, 1 yaşdan 11 yaşa qədər uşaqlara gündə 3 dəfə 1 tablet, yaşı 12 və daha yuxarı olan uşaqlara gündə 3 dəfə 1-2 tablet istifadə etmək lazımdır.

İstifadə qaydası

Tabletlər ağız boşluğunda tədricən həll olmalıdır. Kiçik yaşlı uşaqlar üçün tabletləri az miqdar suda həll etmək olar.

Preparatı qida qəbulundan ən azı yarım saat əvvəl və ya yarım saat sonra istifadə etmək lazımdır.

Əlavə təsirləri

Preparatın istifadəsi ilə əlaqəli əlavə təsirlər çox nadir hallarda (<1/10000) və ya məlum olmayan tezliklə (əldə olunan məlumatlar əsasında tezliyi qiymətləndirmək mümkün deyil) müşahidə olunur: hiperhəssaslıq reaksiyaları, məsələn, dəri üzərində səpgilər və mədə-bağırsaq pozğunluqları.

Belə hallarda preparatın istifadəsini dayandırmaq və həkimə müraciət etmək lazımdır.

Qeyd. Homeopatik preparatların istifadəsi ilə əlaqəli mövcud şikayətlər müvəqqəti pisləşə bilər (ilkın homeopatik kəskinləşmə). Belə hallarda preparatın istifadəsini dayandırmaq və həkimə müraciət etmək tövsiyə olunur.

Doza həddinin aşılması

Müəyyən edilməmişdir.

Buraxılış forması

20 tablet, blisterdə. 2 blister, içlik və rəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən yuxarı olmayan temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

5 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resepsiz buraxılır.

İstehsalçı

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG,
Ştaynenfeld 3, 77736, Sel am Harmersbax, Almaniya.

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

Alpen Pharma GmbH,
Ştaynenfeld 3, 77736 Sell am Harmersbax,
Almaniya.