



E.M.Ağayev

3 fevral 2023-cü il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

PROSTAMED çeynəmə tabletlər
PROSTAMED

Tərkibi

Təsireddi maddələr: yağısızlaşdırılmış balqabaq toxumunun tozu 200 mq; yağısızlaşdırılmış balqabaq toxumu tozunun təmizlənmiş ekstraktı (5-10:1), ekstragent: natrium hidrokarbonat/xörək duzu/təmizlənmiş su (3/6, 1/90,9) – 100 mq; qızılısəbət bitkisinin quru ekstraktı (5-8:1), ekstragent: etanol 60 həcm %-i- 2,6 mq; ağcaqovaq yarpaqlarının quru ekstraktı (5-8:1), ekstragent: etanol 60 həcm %-i- 6,3 mq;

Köməkçi maddələr: laktosa monohidrat, kalsium hidrofosfat, kakao tozu, saxaroza, jelatin, 85%-li qliserin, povidon K25, yüksək dispersli silisium dioksid, talk.

Təsviri

Qabarlıq səthə malik qəhvəyi, girdə tabletlərdir.

Farmakoterapeutik qrupu.

Prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyası zamanı istifadə edilən vasitə.

İstifadəsinə göstərişlər

Sidik ifrazının çətinləşməsi, tez-tez sidik ifrazi, o cümlədən gecələr sidik ifrazi, sidik kisəsinin tam boşalmaması hissi (qalıq sidiyin olması), sidik ifrazına aradan qaldırılması mümkün olmayan çağırışlar. Kəskin və xroniki prostatit (kompleks terapiyanın tərkibində).

Əks göstərişlər

Təsireddi maddələrə, mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsindən olan bitkilərə, salisilatlara və ya digər komponentlərdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq.

Maye qəbulunun azaldılması tövsiyə olunan xəstəliklər, məsələn, ürək və ya böyrəklərin ağrı xəstəlikləri.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Xəstəliyin uzunmüddətli simptomları zamanı və ya içlik vərəqədə göstərilməyən əlavə effektlər meydana çıxdıqda həkimlə məsləhətləşmək lazımdır. Sidikdə qanın aşkar edilməsi, sidik ifrazat yollarının infeksiyası, sidik ifrazi pozğunluqlarının kəskinləşməsi və ya kəskin ləngiməsi zamanı həkimlə məsləhətləşmək xüsusilə vacibdir.

Prostamedin uşaqlar və 18 yaşa qədər gənc insanlar tərəfindən qəbuluna aid kifayət qədər məlumat yoxdur. Buna görə də uşaqlar və 18 yaşa qədər gənc insanlar Prostamed preparatını qəbul etməməlidirlər.

Qalaktozaya qarşı dözümsüzlük, laktosa çatışmazlığı, fruktozaya qarşı dözümsüzlük, qlükoza-qalaktozanın malabsorbsiyası və ya saxaroza-izomaltoza çatışmazlığı kimi nadir irsi xəstəlikləri olan xəstələr Prostamed qəbul etməməlidirlər.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Hələlik Prostamedin digər dərman vasitələrilə qarşılıqlı təsiri öyrənilməmişdir.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləlik və laktasiya dövründə qəbulun təhlükəsizliyi öyrənilməmişdir. Buna görə hamilə və süd verən qadınlar üçün Prostamedin qəbulu tövsiyə edilmir.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Təsir etmir.

İstifadə qaydası və dozasi

Böyükler gündə 3 dəfə, hər dəfə 2-4 tablet qəbul etməlidirlər.

Tabletləri çeynəmək, üstündən kifayət miqdarda su qəbul etmək lazımdır (təxminən $\frac{1}{4}$ -l stəkan içməli su).

Preparatdan istifadənin müddəti 4 həftə təşkil edir.

Əlavə təsirləri

Tək-tək hallarda mədə pozğunluqları, ürəkbulanma, quşma və ishal baş verə bilər. Bundan başqa, allergik reaksiyalar, məsələn, səpgi, qaşınma, dil, ağız və udlağın selikli qişasının ödemi baş verə bilər. Hər-hansı əlavə reaksiya inkişaf etdikdə preparatdan istifadəni dayandırmaq və həkimə müraciət etmək lazımdır.

Buraxılış forması

Çeynəmə tabletlər.

60, 120 və ya 200 tablet, plastik tubda. 1 tub içlik-vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Yararlılıq müddəti

3 il.

Açıldıqdan sonra saxlanma müddəti 3 aydır.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən yuxarı olmayan temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Aptekdən buraxılma şərti

Reseptsiz buraxılır.

İstehsalçı

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG.

Ştaynenfeld 3, 77736 Sell am Xarmersbax, Almaniya.

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany.

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

Alpen Pharma GmbH.

Ştaynenfeld 3, 77736 Sell am Xarmersbax, Almaniya.

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany.

Tel.: +49 (0) 7243 200 49 10.

Mail: ra.germany@alpenpharma.com